

Variedade	PRÍNCIPAIS CARACTERÍSTICAS	MATURAÇÃO	MATRIZ																				
<b>IAC87-3396</b>	Porte Semi - Ereto; Bom TCH; Ótima brotação de soqueira sob palha; Indicada para ambientes médios - restritivos; Perfil Estável.	<b>Ambientes restritivos = 2a Quinzena de Maio (com maturador). Ambientes médios = 2a Quinzena de Junho - Julho</b>	<table border="1"> <tr><td colspan="4"><b>IAC87-3396</b></td></tr> <tr><td>AMBIENTES</td><td>OUTONO</td><td>INVERNO</td><td>PRIMAVERA</td></tr> <tr><td>FAVORÁVEIS</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>MÉDIOS</td><td>3</td><td>4</td><td>8</td></tr> <tr><td>DESFAVORÁVEIS</td><td>6</td><td>7</td><td>9</td></tr> </table>	<b>IAC87-3396</b>				AMBIENTES	OUTONO	INVERNO	PRIMAVERA	FAVORÁVEIS	1	2	5	MÉDIOS	3	4	8	DESFAVORÁVEIS	6	7	9
<b>IAC87-3396</b>																							
AMBIENTES	OUTONO	INVERNO	PRIMAVERA																				
FAVORÁVEIS	1	2	5																				
MÉDIOS	3	4	8																				
DESFAVORÁVEIS	6	7	9																				
<b>IAC91-1099</b>	Porte Ereto; Ótima performance no plantio em colheita mecanizada; Ótima brotação de soqueira sob palha; Ótimo fechamento das entre linhas; Indicada para ambientes médios - favoráveis; Perfil Estável; Ótimo desempenho no plantio de inverno. Responde a Maturador	<b>Ambientes médios / restritivos = 2a Quinzena de Maio. Ambientes médios / favoráveis = Junho / julho</b>	<table border="1"> <tr><td colspan="4"><b>IAC91-1099</b></td></tr> <tr><td>AMBIENTES</td><td>OUTONO</td><td>INVERNO</td><td>PRIMAVERA</td></tr> <tr><td>FAVORÁVEIS</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>MÉDIOS</td><td>3</td><td>4</td><td>8</td></tr> <tr><td>DESFAVORÁVEIS</td><td>6</td><td>7</td><td>9</td></tr> </table>	<b>IAC91-1099</b>				AMBIENTES	OUTONO	INVERNO	PRIMAVERA	FAVORÁVEIS	1	2	5	MÉDIOS	3	4	8	DESFAVORÁVEIS	6	7	9
<b>IAC91-1099</b>																							
AMBIENTES	OUTONO	INVERNO	PRIMAVERA																				
FAVORÁVEIS	1	2	5																				
MÉDIOS	3	4	8																				
DESFAVORÁVEIS	6	7	9																				
<b>IACSP95-5000</b>	Porte Ereto; Ótima performance no plantio em colheita mecanizada; Ótima brotação de soqueira sob palha; Indicada para ambientes médios - favoráveis; Perfil Responsivo; Ótimo desempenho no plantio de inverno. Responde a Maturador	<b>Ambientes médios / restritivos = 2a Quinzena de Maio / Junho (com maturador). Ambientes favoráveis = 2a Quinzena de Agosto - Outubro</b>	<table border="1"> <tr><td colspan="4"><b>IACSP95-5000</b></td></tr> <tr><td>AMBIENTES</td><td>OUTONO</td><td>INVERNO</td><td>PRIMAVERA</td></tr> <tr><td>FAVORÁVEIS</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>MÉDIOS</td><td>3</td><td>4</td><td>8</td></tr> <tr><td>DESFAVORÁVEIS</td><td>6</td><td>7</td><td>9</td></tr> </table>	<b>IACSP95-5000</b>				AMBIENTES	OUTONO	INVERNO	PRIMAVERA	FAVORÁVEIS	1	2	5	MÉDIOS	3	4	8	DESFAVORÁVEIS	6	7	9
<b>IACSP95-5000</b>																							
AMBIENTES	OUTONO	INVERNO	PRIMAVERA																				
FAVORÁVEIS	1	2	5																				
MÉDIOS	3	4	8																				
DESFAVORÁVEIS	6	7	9																				
<b>IACSP96-2042</b>	Porte Semi - Ereto; Alto TCH; Boa brotação de soqueira sob palha; Indicada para ambientes médios - favoráveis; Perfil Estável - Responsiva; Ausência de florescimento.	<b>Indicada para colheita a partir da 2a Quinzena de Julho a Novembro</b>	<table border="1"> <tr><td colspan="4"><b>IACSP96-2042</b></td></tr> <tr><td>AMBIENTES</td><td>OUTONO</td><td>INVERNO</td><td>PRIMAVERA</td></tr> <tr><td>FAVORÁVEIS</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>MÉDIOS</td><td>3</td><td>4</td><td>8</td></tr> <tr><td>DESFAVORÁVEIS</td><td>6</td><td>7</td><td>9</td></tr> </table>	<b>IACSP96-2042</b>				AMBIENTES	OUTONO	INVERNO	PRIMAVERA	FAVORÁVEIS	1	2	5	MÉDIOS	3	4	8	DESFAVORÁVEIS	6	7	9
<b>IACSP96-2042</b>																							
AMBIENTES	OUTONO	INVERNO	PRIMAVERA																				
FAVORÁVEIS	1	2	5																				
MÉDIOS	3	4	8																				
DESFAVORÁVEIS	6	7	9																				
<b>IACSP96-3060</b>	Porte Semi-Ereto; Indicada para ambientes médios - favoráveis; Perfil Estável; Florescimento raro	<b>P.U.I Longo (2a Quinzena de Maio até Outubro)</b>	<table border="1"> <tr><td colspan="4"><b>IACSP96-3060</b></td></tr> <tr><td>AMBIENTES</td><td>OUTONO</td><td>INVERNO</td><td>PRIMAVERA</td></tr> <tr><td>FAVORÁVEIS</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>MÉDIOS</td><td>3</td><td>4</td><td>8</td></tr> <tr><td>DESFAVORÁVEIS</td><td>6</td><td>7</td><td>9</td></tr> </table>	<b>IACSP96-3060</b>				AMBIENTES	OUTONO	INVERNO	PRIMAVERA	FAVORÁVEIS	1	2	5	MÉDIOS	3	4	8	DESFAVORÁVEIS	6	7	9
<b>IACSP96-3060</b>																							
AMBIENTES	OUTONO	INVERNO	PRIMAVERA																				
FAVORÁVEIS	1	2	5																				
MÉDIOS	3	4	8																				
DESFAVORÁVEIS	6	7	9																				
<b>IACSP95-5094</b>	Porte Semi - Ereto; Alto TCH; Ótima performance no plantio em colheita mecanizada; Ótima brotação de soqueira sob palha; Indicada para ambientes médios - favoráveis; Perfil Estável; Ótimo desempenho no plantio de inverno. Ausência de florescimento.	<b>Indicada para colheita a partir da 2a Quinzena de Maio / Setembro</b>	<table border="1"> <tr><td colspan="4"><b>IACSP95-5094</b></td></tr> <tr><td>AMBIENTES</td><td>OUTONO</td><td>INVERNO</td><td>PRIMAVERA</td></tr> <tr><td>FAVORÁVEIS</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>MÉDIOS</td><td>3</td><td>4</td><td>8</td></tr> <tr><td>DESFAVORÁVEIS</td><td>6</td><td>7</td><td>9</td></tr> </table>	<b>IACSP95-5094</b>				AMBIENTES	OUTONO	INVERNO	PRIMAVERA	FAVORÁVEIS	1	2	5	MÉDIOS	3	4	8	DESFAVORÁVEIS	6	7	9
<b>IACSP95-5094</b>																							
AMBIENTES	OUTONO	INVERNO	PRIMAVERA																				
FAVORÁVEIS	1	2	5																				
MÉDIOS	3	4	8																				
DESFAVORÁVEIS	6	7	9																				
<b>IACSP96-7569</b>	Porte Semi decumbente, Alto TCH, Ótima maturação no início e meio de safra em ambientes médios / restritivos. Ótima brotação de soqueira	<b>Indicada para colheita no início de safra até a 1a quinzena de Julho.</b>	<table border="1"> <tr><td colspan="4"><b>IACSP96-7569</b></td></tr> <tr><td>AMBIENTES</td><td>OUTONO</td><td>INVERNO</td><td>PRIMAVERA</td></tr> <tr><td>FAVORÁVEIS</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>MÉDIOS</td><td>3</td><td>4</td><td>8</td></tr> <tr><td>DESFAVORÁVEIS</td><td>6</td><td>7</td><td>9</td></tr> </table>	<b>IACSP96-7569</b>				AMBIENTES	OUTONO	INVERNO	PRIMAVERA	FAVORÁVEIS	1	2	5	MÉDIOS	3	4	8	DESFAVORÁVEIS	6	7	9
<b>IACSP96-7569</b>																							
AMBIENTES	OUTONO	INVERNO	PRIMAVERA																				
FAVORÁVEIS	1	2	5																				
MÉDIOS	3	4	8																				
DESFAVORÁVEIS	6	7	9																				
<b>IACSP97-4039</b>	Variedade com altíssimo teor de sacarose e alto TCH. Ambientes Restritivos no início de safra	<b>P.U.I Longo (1a Quinzena de Maio até Outubro)</b>	<table border="1"> <tr><td colspan="4"><b>IACSP97-4039</b></td></tr> <tr><td>AMBIENTES</td><td>OUTONO</td><td>INVERNO</td><td>PRIMAVERA</td></tr> <tr><td>FAVORÁVEIS</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>MÉDIOS</td><td>3</td><td>4</td><td>8</td></tr> <tr><td>DESFAVORÁVEIS</td><td>6</td><td>7</td><td>9</td></tr> </table>	<b>IACSP97-4039</b>				AMBIENTES	OUTONO	INVERNO	PRIMAVERA	FAVORÁVEIS	1	2	5	MÉDIOS	3	4	8	DESFAVORÁVEIS	6	7	9
<b>IACSP97-4039</b>																							
AMBIENTES	OUTONO	INVERNO	PRIMAVERA																				
FAVORÁVEIS	1	2	5																				
MÉDIOS	3	4	8																				
DESFAVORÁVEIS	6	7	9																				